

MegaGrow® ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

MegaGrow®



**Υγρό λίπασμα - βιοδιεγέρτης από εκχύλισμα φυκών
εμπλουτισμένο με Βόριο, για πρόληψη και θεραπεία
της τροφοπενίας Βορίου.**

Κατάλληλο για όλες τις απαιτητικές καλλιέργειες σε Βόριο:
Ελιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Κερασιά, Αμπέλι, Σακχαρότευτλα,
Καπνό, Ηλίανθο, Μηδική, Σέλινο, Καρότο, Παντζάρια κλπ.



BIO

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους
Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 (ΕΕ L 189) και 889/2008 (ΕΕ L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αριθμός εγγραφής: 2698

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 20 ΛΙΤΡΑ



Διανομέας Κύπρου
Α&Ε ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ: Αγγελόκτιστης 18, 7550 Κίη Τ. 24 816363 Φ. 24 423160

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (1): Μ. Παντελή 73, 5320 Λιοπέτρι Τ. 23 816363 Φ. 23 942253

ΠΑΦΟΣ (2): Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού, Αγία Βαρβάρα Τ. 26 816363

ΛΕΜΕΣΟΣ (3): Δίκιμου 3, 4186 Ύψωνα Τ. 25 816363

E: main@technochimiki.com.cy http://www.technochimiki.com.cy



Τυποποίηση - Συσκευασία - Αποκλειστική Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής

Τηλ: 210 5550431 • Fax: 210 5556100

www.ellagret.gr

MegaGrow B

Το προϊόν ανήκει στην ομάδα Γ των Νέου Τύπου Λιπασμάτων. (Οργανοχημικά - Οργανοανόργανα ή/και χημικά κύριων και δευτερευόντων στοιχείων με ή χωρίς ιχνοστοιχεία).

ΣΥΝΘΕΣΗ: Το MegaGrow® B περιέχει:

ΟΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΟ ΒΟΡΙΟ (B) (από Sodium Borate): 1,8% β/ο (1,7 % β/β)

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΥΚΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ): 4% β/ο (3,77% β/β) στο οποίο περιέχονται: **ΦΥΤΟΡΜΟΝΕΣ:** Αυξίνες, Γιββερελλίνες, Κυτοκινίνες, που διεγείρουν κυτταρικές διαδικασίες ανάπτυξης.

ΦΥΣΙΚΟΙ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Μπεταίνες (ισοροπτημένο μείγμα γ-αμινοβουτυρικού οξέος, δ-αμινοβαλερικού οξέος & γλυσινιομπεταίνης).

ΟΥΣΙΕΣ ΨΥΗΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ: Αλγινικό οξύ, Μανιτόλη, Λαμιναρίνη, Πεντοζάνες, Αμινοξέα, Χημικά οξέα κ.ά.

ΜΑΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ που τα περισσότερα βρίσκονται σε άμεσα απορροφώμενη μορφή (N, P, K, Fe, Zn, B, I, Br, Cu, Ni, Mo, Co, Si, Al κ.ά.), περιέχονται σε πολύ μικρές ποσότητες.

PH προϊόντος: 7,6-7,8 (σε 10% διάλυμα)

Ηλεκτρική αγωγιμότητα 1‰ (mS/cm) 18°C: 0,65

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το MegaGrow® B, είναι υγρό λίπασμα - βιοδιεγέρτης από εκχύλισμα φυκών, εμπλουτισμένο με βόριο, για πρόληψη και θεραπεία της τροφопенίας βόριου. Το MegaGrow® B, αποτελεί φυσική πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά, αφού παράγεται από 100% εκχύλισμα θαλάσσιων φυκών του είδους *Ascophyllum nodosum* και είναι εμπλουτισμένο με 1,8% β/ο (1,7% β/β) Βόριο από άλας βόριου. Είναι προϊόν βασικό για την ανάπτυξη των φυτών, διότι το άμεσα αφομοίωσιμο βόριο που περιέχει αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την έκπτυξη της νέας βλάστησης, την ανθοφορία, το σχηματισμό και την ποιότητα των καρπών. Είναι πολύ σημαντικό τα φυτά να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ποσότητα βόριου κατά την άνθηση και την καρποφορία, αφού αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη του γυμνοσπέρμους αλλά και στη μετακίνηση, το μεταβολισμό και τη συγκέντρωση των σακχάρων. Τροφопения βόριου εμφανίζεται συνήθως σε πτωχή από οργανική ουσία αμμώδη εδάφη, σε πολύ όξινα ή αλκαλικά εδάφη ενώ και οι απαιτήσεις των φυτών ποικίλουν σημαντικά. Συμπτώματα τροφопенίας βόριου παρουσιάζονται κυρίως στα νέα, αναπτυσσόμενα φυτικά μέρη.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό περίπου μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την απαιτούμενη, σύμφωνα με τη συνιστώμενη δόση, ποσότητα MegaGrow® B. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν πρέπει να συνδυάζεται με πολτούς / λάδια, με ορμονικά σκευάσματα και με πολύ όξινα ή αλκαλικά σκευάσματα. Επίσης, συνιστάται να μην αυξάνονται οι δόσεις, να μην εφαρμόζεται όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και να γίνεται δοκιμή μικρής κλίμακας σε περιπτώσεις ανάμειξης του με άλλα σκευάσματα, προς αποφυγή φαινομένων φυτοτοξικότητας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό για καμία καλλιέργεια.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το προϊόν να αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε μέρος ασφαλές, δροσερό, ξηρό και σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C έως και 30°C.

Ανακινείτε καλά πριν από κάθε χρήση.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΑΡΙΘ. ΠΑΤΕΝΤΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 20 ΛΙΤΡΑ

Πεδίο εφαρμογής - Δόσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Αριθμός εφαρμογών:

Διαφυλλικοί ψεκασμοί: 2-3 εφαρμογές με 50-200 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό, από την έναρξη της βλαστικής περιόδου. Οι ψεκασμοί φυλλώματος είναι ιδιαίτερα απαραίτητοι όταν απαιτείται άμεση απορρόφηση βόριου από τα φυτά.

Ριζοποτίσματα με στάγδην άρδευση: 2-3 εφαρμογές με 1 κ.εκ. / φυτό ή 0,5-1 lt / στρέμμα (500-1000 λίτρα νερό / στρέμμα).

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ: ΜΗΛΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 50-150 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό.	α) Άνοιγμα βλαστοφόρων σφαλμών, β) Τέλος άνθησης καρπιτιά, γ) Νεαρά φρούτα, δ) Πτώση των φύλλων.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ	2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 50-150 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό.	α) 15-25 ημέρες πριν την άνθηση, β) Τέλος άνθησης (στο δέσιμο), γ) 15-20 ημέρες μετά.
ΕΛΙΑ	2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 50-150 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό.	α) 15-25 ημέρες πριν την άνθηση, β) Τέλος άνθησης (στο δέσιμο), γ) 15-20 ημέρες μετά.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΟΣΠΡΙΑ, ΚΑΠΝΟΣ, ΠΑΤΑΤΑ	2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 50-200 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό. 2-3 ριζοποτίσματα με 0,5-1 lt / στρέμμα.	Από τα 4-6 φύλλα κάθε 10-20 ημέρες. Τα ριζοποτίσματα να ξεκινούν 10-15 μέρες μετά τη βλάστηση ή τη μεταφύτευση.
ΒΑΜΒΑΚΙ ΗΛΙΑΝΘΟΣ	2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 50-150 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό.	Από τα 4 - 6 φύλλα, κάθε 15-20 ημέρες.
ΑΜΠΕΛΙ	2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 50-150 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό.	α) Με την εμφάνιση της βλάστησης, β) Πριν την άνθηση, γ) Στο δέσιμο του μούρου.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: ΤΕΥΤΛΑ, ΜΗΔΙΚΗ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ, Κ.Α.	2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 50-150 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό.	Από την έναρξη της βλάστησης κάθε 15-20 ημέρες.
ΚΑΛΛΙΣΤΙΚΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ	2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 50-150 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό. 2-3 ριζοποτίσματα, με 0,5-1 lt / στρέμμα.	Με την έναρξη της βλάστησης κάθε 15 - 20 ημέρες.