

100% ΟΡΓΑΝΙΚΟ – ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

MegaGrow®



ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΚΩΝ

Κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές,
εμβάπτιση σπόρων και ριζοποτίσματα σε όλες τις καλλιέργειες

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών
(σύμφωνα με την ΥΑ 217217/8-1-2004, ΦΕΚ 35/Β/16-1-2004)

8% ΣΕ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΚΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ *ASCOPHYLLUM NODOSUM*

BIO

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα
με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 (ΕΕ L 189) και 889/2008 (ΕΕ L 250),
όπως κάθε φορά ισχύουν.

Αριθμός εγγραφής: 2700

Καθαρό Βάρος: 5 ΛΙΤΡΑ



Τυποποίηση - Συσκευασία - Αποκλειστική Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr



Διανομέας Κύπρου

Α&Ε ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ: Αγγελόκτιστης 18, 7550 Κίτι Τ. 24 816363 Φ. 24 423160

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (1): Μ. Παντελή 73, 5320 Λοσιέρι Τ. 23 816363 Φ. 23 942253

ΠΑΦΟΣ (2): Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού, Αγία Βαρβάρα Τ. 26 816363

ΛΕΜΕΣΟΣ (3): Δικώμου 3, 4186 Ύψωνας Τ. 25 816363

E: main@technochimiki.com.cy <http://www.technochimiki.com.cy>

MegaGrow® ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ: Το MegaGrow® περιέχει 80 γρ. εκχυλίσματος φυκών του είδους *Ascophyllum Nodosum* ανά λίτρο σκευάσματος, εκ των οποίων το 63,4% w/w είναι οργανική ουσία. Πιο συγκεκριμένα περιέχει:

ΦΥΤΟΡΜΟΝΕΣ: Αυξίνες, Γιββερελλίνες, Κυτοκινίνες.

ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Μπεταΐνες (ισοροπτημένο μείγμα γ-αμινοβουτυρικού οξέος, δ-αμινοβαλερικού οξέος και γλυσινωμπεταΐνης).

ΟΥΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ: Αιθινικό οξύ, Μανιτόλη, Λαμναρίνη, Πεντοζάνες, Αμινοξέα, Βιταμίνες κ.ά.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το MegaGrow® είναι φυσικός βιοδιεγέρτης, με βάση εκχυλίσμα θαλάσσιων φυκών του είδους *Ascophyllum Nodosum*.

Είναι σε υγρή μορφή και εφαρμόζεται με εμβάπτιση σπόρων ή εμποτισμό εδαφικού υποστρώματος σπορειών, με διαφυλλικούς ψεκασμούς και ριζοπότισμα.

Με το MegaGrow® επιτυγχάνουμε:

- Αύξηση και επιτάχυνση της φυτρωτικότητας και της ριζοβολίας
- Ισχυροποίηση του ριζικού συστήματος και του βλαστού
- Επιτάχυνση της ανάπτυξης και πρωίμηση της παραγωγής
- Αύξηση της καρποδότης
- Βελτίωση της ποιότητας των καρπών
- Μεγαλύτερη αντοχή στα διάφορα «στρες» και σε αρκετές ασθένειες - εχθρούς
- Βελτίωση των βιολογικών και φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους
- Συνεργιστική αύξηση της αποτελεσματικότητας εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων.

Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας

Καθαρό Βάρος: 5 ΛΙΤΡΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΟΣΠΡΙΑ: α) Για εμβάπτιση σπόρων ή εμποτισμό εδαφικού υποστρώματος σπορειών με δόση 1 λίτρο/ 100 κιλά νερό. β) Για διαφυλλικούς ψεκασμούς με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό. γ) Για ριζοπότωση, 1 κ.εκ. ανά φυτό ή 5-10 λίτρα/ στρέμμα με 3-4 εφαρμογές κάθε 15 ημέρες μετά την έκπτυξη των πρώτων φυλλών. Για τις καλλιέργειες που μεταρτυούνται, οι εφαρμογές ξεκινούν 15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, ενώ γίνεται και μια πριν απ' αυτή με μικρότερη δόσολογία.

ΠΑΤΑΤΑ: α) Πριν την σπορά: Εμβάπτιση κονδύλων για 24 ώρες σε διάλυμα με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό. β) Μετά τη σπορά: 3-4 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες, που ξεκινούν όταν το φύλλωμα φτάσει τα 7-10 εκ., με δόση 1-1,5 λίτρα/ 100 κιλά νερό.

ΑΜΠΕΛΙ: α) Εμποτισμός εδαφικών υποστρωμάτων για ριζοβόληση μοσχευμάτων με δόση 1 λίτρο/ 100 κιλά νερό. β) 3-4 ψεκασμοί με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό. Ο πρώτος ξεκινά με την εμφάνιση των πρώτων φυλλών και οι υπόλοιποι πριν και μετά την άνθηση.

ΒΑΜΒΑΚΙ: 3-4 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό, μετά την έκπτυξη των πρώτων φυλλών.

ΚΑΡΠΟΣ: Όμοια με τα λαχανικά που μεταρτυούνται.

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ (ΜΗΛΟΕΙΔΗ-ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ): 3-4 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες μετά την άνθηση, με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό και ένας μετά τη συγκομιδή με δόση 1-1,5 λίτρα/ 100 κιλά νερό.

ΑΕΙΘΑΛΗ (ΞΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ-ΕΛΙΑ): Πρώτος ψεκασμός πριν την άνθηση και 3-4 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες μετά την άνθηση, με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό.

ΣΙΤΗΡΑ: 1-2 ψεκασμοί μετά την έκπτυξη των πρώτων φυλλών και ένας νωρίς την άνοιξη με δόση 1-1,5 λίτρα/ 100 κιλά νερό.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ - ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ΑΡΒΟΣΙΤΟΣ - ΜΗΔΙΚΗ - ΤΡΙΦΥΛΛΗ, κ.ά.): 2-3 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες μετά την έναρξη της βλάστησης με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό.

ΓΚΑΖΟΝ: α) Για ψεκασμούς με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό β) Για ριζοπότωση, 1-1,5 λίτρα/ στρέμμα. Πραγματοποιείται ένας ψεκασμός μετά την έναρξη της βλάστησης και τακτικοί ψεκασμοί κάθε 15-20 ημέρες καθόλη την περίοδο ανάπτυξης. Εφαρμόζεται και με το σύστημα άρδευσης.

ΚΑΛΩΔΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ: α) Για ψεκασμούς με δόση 200-500 κ.εκ./ 100 κιλά νερό β) Για ριζοπότωση, με δόση 1 κ.εκ./ φυτό ή 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό. β) Πριν την άνοιξη και καθόλη την περίοδο ανάπτυξης, κάθε 10-15 ημέρες.

ΦΥΤΟΘΕΚΙΟΤΗΤΑ: Στις συνδυασμένες χρήσεις και δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό για καμία καλλιέργεια.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με όλα τα γνωστά σκευάσματα εκτός από τα ορμονικά ζιζανιοκτόνα, όξινα και αλκαλικά σκευάσματα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό χώρο και σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 30 °C. Να φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.