

Το προϊόν ανήκει στην ομάδα Γ των Νέου Τύπου Λιπασμάτων. (Οργανοχημικά - Οργανοανόργανα ή/και χημικά κύριων και δευτερευόντων στοιχείων με ή χωρίς ιχνοστοιχεία).

ΣΥΝΘΕΣΗ: Το MegaGrow® Fe περιέχει:
Ολικό διαλυτό σίδηρο (Fe) από θειικό σίδηρο: 2,2% β/ο (2,0% β/β).
Εκχύλισμα θαλάσσιων φυκών (οργανική ουσία) του είδους *Ascophyllum nodosum* 5% β/ο (4,5% β/β), στο οποίο περιέχονται:
Φυτορμόνες: Αυξίνες, Γιββερελλίνες, Κυτοκινίνες, που διεγείρουν κυτταρικές διαδικασίες ανάπτυξης.
Φυσικοί Βιοδιεγέρτες Ανάπτυξης: Μπεταΐνες (ισορροπημένο μείγμα γ-αμινοβουτυρικού οξέος, δ-αμινοβαλερικού οξέος & γλυσινομπεταΐνης).
Ουσίες υψηλής βιολογικής αξίας για τα φυτά: Αλγινικό οξύ, Μανιτόλη, Λαμιναρίνη, Πεντοζάνες, Αμινοξέα, Χημικά οξέα κ.ά.
Μακροστοιχεία & Ιχνοστοιχεία που τα περισσότερα βρίσκονται σε άμεσα απορροφώσιμη μορφή (N, P, K, Fe, Zn, B, I, Br, Cu, Ni, Mo, Co, Si, Al, κ.ά.), περιέχονται σε πολύ μικρές ποσότητες.

pH προϊόντος: 4,2-4,8 σε διάλυμα 10% σε απιονισμένο νερό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το MegaGrow® Fe είναι υγρό λίπασμα - βιοδιεγέρτης με βάση εκχύλισμα φυκών, εμπλουτισμένο με σίδηρο (Fe) σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή, για την πρόληψη και θεραπεία της τροφονείας σιδήρου. Κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές και ριζοπότισμα με όλα τα συστήματα ψεκασμού ή άρδευσης σε όλες τις καλλιέργειες.

Το MegaGrow® Fe αποτελεί φυσική πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά, αφού παράγεται από 100% εκχύλισμα θαλάσσιων φυκών του είδους *Ascophyllum nodosum* και είναι εμπλουτισμένο με 2,0% β/β άμεσα αφομοιώσιμο Σίδηρο (Fe), από άλας Σιδήρου. Είναι προϊόν βασικό για την ανάπτυξη των φυτών διότι η άμεσα αφομοιώσιμη μορφή σιδήρου που περιέχει, αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για τη σύνθεση της χλωροφύλλης και τη διεξαγωγή των οξειδο-αναγωγικών αντιδράσεων του μεταβολισμού των φυτών. Έτσι, επιταχύνεται η ανάπτυξη των φυτών, λόγω της αυξημένης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και βελτιώνεται η καρποφορία. Το κυριότερο σύμπτωμα τροφονείας σιδήρου είναι η έντονη χλώρωση που ξεκινάει από τα νεώτερα φύλλα ενώ τα νεύρα παραμένουν πράσινα, η οποία στη συνέχεια επεκτείνεται στα παλαιότερα φύλλα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε στο άνω μέρος της φιάλης



MegaGrow® ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

MegaGrow®



**Οργανοανόργανο υγρό
λίπασμα - φυσικός
βιοδιεγέρτης με βάση
εκχύλισμα θαλάσσιων φυκών
του είδους *Ascophyllum
nodosum*, εμπλουτισμένο με
Σίδηρο (Fe)**

**Κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές
και ριζοποτίσματα**



Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 (ΕΕ L 189) και 889/2008 (ΕΕ L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αριθμός εγγραφής: 2697



Διανομέας Κύπρου

Α&Ε ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ: Αγγελοκτήσιος 18, 7550 Κίτι Τ. 24 816363 Φ. 24 423160

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (1): Μ. Παντελή 73, 5320 Λιοπέτρι Τ. 23 816363 Φ. 23 942253

ΠΑΦΟΣ (2): Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού, Αγία Βαρβάρα Τ. 26 816363

ΛΕΜΕΣΟΣ (3): Δικώμου 3, 4186 Ύψωνας Τ. 25 816363

E: main@technochimiki.com.cy http://www.technochimiki.com.cy



Τυποποίηση - Συσκευασία - Αποκλειστική Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήλαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής

Τηλ: 210 5550431 • Fax: 210 5556100

www.ellagret.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Καλλιέργειες/ Χρήσεις - Δοσολογία - Χρόνος και Τρόπος Εφαρμογής:

Χρήσεις/ Καλλιέργειες	Δοσολογία, χρόνος και τρόπος εφαρμογής
Αμπέλι, Δένδρα, Λαχανικά, Κηπευτικά, Καλλωπιστικά, Χορτοδοτικά Φυτά	Διαφυλλικοί ψεκασμοί: 3-4 εφαρμογές με δόση 0,5-1 lt/ 100 lt νερό, κατά την περίοδο ανάπτυξης.
Γκαζόν	3-5 εφαρμογές με ριζοποτίσματα κατά την περίοδο ανάπτυξης με δόση 1-1,5 λίτρα/ 1.000 τ.μ.
Λαχανικά, Κηπευτικά, Καλλωπιστικά, Χορτοδοτικά Φυτά	Ριζοποτίσματα με δόση 1 ml/ φυτό ή 3-5 lt/ στρέμμα (500-1000 lt νερό/ στρέμμα). Εφαρμόζεται αρχικά στα σπορεία και ακολουθούν 3-4 εφαρμογές μετά τη μεταφύτευση για τις καλλιέργειες που μεταφυτεύονται κατά την περίοδο ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι **προληπτικές εφαρμογές** πρέπει να ξεκινούν με την έναρξη της βλάστησης ή πριν την ανθοφορία και ακολουθούν οι επόμενες μετά το τέλος της άνθησης, κάθε 15-20 ημέρες.

Οι **θεραπευτικές εφαρμογές** πρέπει να γίνονται αμέσως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα (αρχή καλοκαιριού) με επαναλήψεις ανά 15-20 ημέρες. Για τις θεραπευτικές εφαρμογές πρέπει να ακολουθείται η μεγαλύτερη δοσολογία.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα περισσότερα σκευάσματα εκτός από εκείνα που είναι πολύ όξινα ή αλκαλικά με πολλούς λάδια και με ορμονικά σκευάσματα. Συνίσταται να μην αυξάνονται οι δόσεις, να μην εφαρμόζεται όταν επικρατούν ψηλές θερμοκρασίες και να γίνεται δοκιμή μικρής κλίμακας σε περιπτώσεις ανάμιξης του με άλλα σκευάσματα, προς αποφυγή φαινομένων φυτοτοξικότητας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό για καμία καλλιέργεια.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C έως και 30 °C.