

## Οδηγίες χρήσης

### ΦΡΟΥΤΟΔΕΝΤΡΑ, ΦΡΑΟΥΛΕΣ - ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:

Το Biopolin Zn θα πρέπει να εφαρμόζεται με ψεκάσμο σε όλη την έκταση, σε δόση 200ml/δεκ. (όγκος νερού: 50-75 L/δεκ.).

Χρόνος εφαρμογής: Το Biopolin Zn πρέπει να εφαρμόζεται μια φορά στην αρχή της περιόδου ανθοφορίας ή το αργότερο πριν το στάδιο της πλήρους άνθησης, στο οποίο η πλειονότητα των ανθέων είναι πλήρως ανοιχτά. Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές μπορεί να είναι απαραίτητες για καλλιέργειες μακράς ανθοφορίας. Η πρώτη εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται στη συνιστώμενη πλήρη δόση του προϊόντος (200ml/δεκ.). Οι επόμενες εφαρμογές πρέπει να γίνονται περίπου κάθε δύο εβδομάδες με τη μισή δόση του προϊόντος (100ml/δεκ.) καθ' όλη τη διάρκεια της ανθοφορίας.

### ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ, ΗΛΙΑΘΟΣ, ΦΑΓΟΠΥΡΟ, ΦΥΤΟ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ:

Το Biopolin Zn πρέπει να εφαρμόζεται μια φορά μεταξύ της έναρξης ανθοφορίας και της πλήρους ανθοφορίας (BBCH 61-65) με συμβατικό εξοπλισμό ψεκάσμου. Η εφαρμογή πρέπει να γίνει με μια από τις πιο κάτω μεθόδους:

1. Ψεκάσμος ολόκληρης της έκτασης, με Biopolin Zn σε δόση 75-100ml/δεκ., με όγκο νερού 20-30L/δεκ.
2. Ψεκάσμος περιμετρικά και στο εσωτερικό της καλλιέργειας κάθε τέταρτη-πέμπτη γραμμή (αρκεί να ψεκαστεί περίπου το 25%-30% της καλλιέργειας) με Biopolin Zn αραιωμένο σε νερό σε αναλογία 1% (1L Biopolin ανά 100L νερού).

## Γενικές Οδηγίες

1. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση πρωί, σε ζεστό, χωρίς αέρα και βροχή καιρό.
2. Εάν σημειωθεί έντονη βροχόπτωση μετά την εφαρμογή, συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής με πλήρη δόση του προϊόντος (200ml/δεκ.).
3. Πριν από την εφαρμογή του μείγματος με άλλα προϊόντα (π.χ. μυκητοκτόνο), συνιστάται να πραγματοποιηθεί δοκιμή συμβατότητας και να ελεγχθεί εάν προκαλούνται φυσικές αλλαγές.
4. Να μην χρησιμοποιείται σε μείγμα με προϊόντα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τις μέλισσες π.χ. εντομοκτόνα.

Περιεχόμενο:

1L

POLISH  
PRODUCT

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ &  
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

# Biopolin Zn



## Ελκυστικό μελισσών

Προσελκύει και ενεργοποιεί το έργο των μελισσών και άλλων επικονιαστών των καλλιεργειών



## Οδηγίες χρήσης

Το Biopolin Zn προορίζεται για ψεκάσμο ανθοφόρων καλλιεργειών έτσι ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα τους για τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάσας (μέλισσες mason, βομβίνοι).

Στα φυτά που εφαρμόζεται το Biopolin Zn υπάρχει συχνότερη επισκεψιμότητα από έντομα επικονιάσας η οποία οδηγεί σε καλύτερη επικονίαση.

Το Biopolin Zn ενεργοποιεί το έργο των μελισσών στα λουλούδια και αποτρέπει τις μέλισσες να αναζητούν τροφή έξω από την καλλιέργεια - στόχο.

Η υψηλότερη απόδοση και η καλύτερη ποιότητα των καλλιεργειών είναι τα οφέλη της χρήσης του Biopolin Zn.

## ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η αποτελεσματικότητα του Biopolin Zn παρέχεται από την τεχνολογία Slow Release Technology™ (βραδείας αποδέσμευσης), η οποία εμποδίζει την ταχεία εξάτμιση των ελκυστικών ουσιών και παρέχει μακράς διάρκειας δράση.

Μια εφαρμογή είναι αρκετή για υψηλή αποτελεσματικότητα!



## Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα Biopolin Zn στο ψεκαστικό δοχείο το οποίο είναι μερικώς γεμάτο με νερό αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι την ολοκλήρωση του ψεκάσμου. Ξεπλύνετε καλά το άδειο μπουκάλι και ρίξτε το νερό του ξεπλύματος στο ψεκαστικό υγρό. Πλύνετε καλά τον εξοπλισμό μετά τη χρήση.

## Διάρκεια ζωής προϊόντος:

3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του

**Αρ. Παρτίδας/Ημερ. Παραγωγής:** Βλέπε συσκευασία

Το Biopolin Zn είναι εγγεγραμμένο από την ICB Pharma. Η φόρμουλα του Biopolin Zn είναι προστατευμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

**Σύνθεση:** μείγμα φυσικών ενώσεων τερπενίου, τερπενοειδών και πολυσακχαριτών, πρόσθετα φυσικής προέλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες αποθηκεύστε στους τοπικούς γεωπόνους της εταιρείας μας και στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.

## BIOPOLIN Zn

**Συστατικά που συμβάλλουν στην ταξινόμηση:**

Κιτράλη, 2-methoxy-4-(propenyl)phenol.

Περιέχει: 1,2-benzisothiazolin-3-one.

**UFI: 6D10-10S2-H00V-EAFO**

## ΚΙΝΔΥΝΟΣ:



Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μάσκα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

## ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

ICBpharma Crop Solutions\*

ICB Pharma Tomasz Świątosławski, Paweł Świątosławski Sp. J.  
ul. Moździerzowców 6a  
43-602 Jaworzno, POLAND  
Phone. +48 32 745 47 00

## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ  
A&E ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΑΤΑ

A&E ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΑΤΑ  
Λεωφόρος Αγγελόκτιστης 18, 7550 Κίτι  
Τηλ: 24816363, Φαξ: 24423160  
Email: main@technochimiki.com.cy  
https://www.technochimiki.com.cy/

