

**Μην χρησιμεύετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.** Η μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επικονιαστικά υδάτα. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς για αφήνετε μια αμέλιαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα: Σε τοπάτα, μελιτάσια και καλοκυνθέσιες (υπαίθριο) 5 μέτρων – σε εσωπεριδεδή 15 μέτρων – σε αγκάθια 30 μέτρων & 20 μέτρων σε συνυπόσιο με τη λύση ακροφύσιων μελωσής της διασποράς κατά 75%. Για να προστατέψετε τα αρθροπόδια μη στόχους να αφήνετε μια αμέλιαστη ζώνη προστασίας από ακαλλιέργεις εκτάσεις: Σε τοπάτα, μελιτάσια και καλοκυνθέσιες (υπαίθριο) 5 μέτρων – σε εσωπεριδεδή 10 μέτρων σε συνυπόσιο με τη λύση ακροφύσιων μελωσής της διασποράς κατά 90% – σε αγκάθια 10 μέτρων σε συνυπόσιο με τη λύση ακροφύσιων μελωσής της διασποράς κατά 80%. **Επικινδύνου για τις μέλισσες:** Για να προστατέψετε τις μέλισσες κατά άμεσα έντονα επικινδύνων μην κραυγαπούστε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους/της κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Σε καλλιέργειες θερμοκηπίου θα πρέπει να περάσουν 4 ημέρες από την εφαρμογή του ακευάσματος και την εξαπόλυτη εντόμων επικινδύνης στη θερμοκηπία και 14 ημέρες για την έξαπολυτη ωφέλιμων εντόμων. **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρωπινή υγεία και το περιβάλλον,** ακολουθήστε τις διδημέτες χρήσης:

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου & των κύνων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το ψυτοπροστατευτικό προϊόν:** Όταν έχει ετεγγύηστο το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του ψυτοπροστατευτικού προϊόντος:** Διατηρείται στην αρχική του παραβιβατική συσκευασία σε έγρα, θρεορέ και καλά αεριζόμενο χώρο. Δε αυτές τις συνθήκες διατηρέται σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσαση του ψυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Κανένα δοχείο συσκευασίας ζεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γινεται τριπλό ξέπλυμα τον νερό του ζεπλωματος τα ρίγνωσα στο ψεκαστικό υγρό και στη συνέχεια αφού καταστραφθήσαν προστιθύουν ρίγνωσα, με τριπλά, για τη διασφάλιση της υπ' περιστέρω χρήσης, να εγκατασταθεί στη σημεριά στην ανακύκλωση ή άνακτηση ενέργειας.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ηγετούτε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέρη τη μέση με νερό. Προσθέτετε στο ψεκαστικό δοχείο την συνιστώσανη ποσότητα ακευάσματος, αναδεινούντας συμπληρώνοντας το υπόλοιπο νερό σύμφωνα την ανάδευτη.

**Καθαρισμός ψεκαστικού:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του ακευάσματος. Ζεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, 3 φορές με καθαρό νερό.

## ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ

Α&Ε ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ Α.Τ.Α.

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά/Διανομέας:  
Α&Ε ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΑΤΑ  
Λευφόρος Αγγελόκητης 18, 7550 Κίττι  
Τηλ: 24816363, Φαξ: 24423160  
Email: main@technochimiki.com.cy  
www.technochimiki.com.cy

Κάτοχος της άδειας:

LAINCO S.A., Polígono Industrial Can Jardi,  
Avda. de Bizi, 8-12 08191 Rubí, Barcelona, Ispania.

# Butik EW

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθμός Άδειας: 3772

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου κατά των κινητών μορφών εντόμων και θηράρων. Προκαλεί παράλυση στά έντομα με αποτέλεσμα το θάνατο τους από αστιά, σε διάστημα 3-5 ημέρων από τον ψεκασμό.

**ΕΠΤΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Abamectin: 1,8% β/ο  
Βοηθητικές συστάσεις: 97,8% β/β

### ΠΡΟΣΟΧΗ:



Επιβλαβές σε περίπτωση κατάσπονσης. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydroisotiazol-3-one και 2-Methyl - 2,3 - dihydroisotiazol-3-one (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**Προφυλάξεις:** ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΛΕΙΔΟΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Μην ανανέψετε σταγονίδια, εκνεύματα. Γίλησετε σχολιστικά με νερό και ασπουντι μετά τη χειρισμό. Μην τρώτε ή καπνίσετε, σταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτική γάντια και προστατευτικά ενδύματα. Διαίθεση περιχομένου/περιέκτη δύματα με την ισχυρότατα νομοθεσία. Φοράτε κατάληλα γάντια κατά την αναμία / φόρτωση και γάντια και προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση που εισέβετε στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε κατάληλη προστατευτική ενδύμασια και γάντια.

**Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο:** Συμβουλεύεθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ζεπλύνετε το στόμα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ζεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ζεπλύνετε με άριθμο νερό και ασπουντι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

### Φάσμα Δράσης:

**ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπφρουτ, Φράπα, Κιτρολέμονα, Περγαμόντα, Κουμκουάτ Νεραντζιά): Κίτρινος τετράνυχος: 30 κ.ε.κ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-80 κ.ε.κ./δέκ. Κόκκινος τετράνυχος των εσπεριδοειδών: 40 κ.ε.κ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ογκός ψεκ. υγρού 100-200 λίτρα/δέκ. Με την εμφάνιση της προσβολής, κατά τη βλάστηση και κατά το δέσμινο των καρπών). **ΑΧΑΛΑΔΙΑ:** Ψύλλα. **Κίτρινος Τετράνυχος:** 50-100 κ.ε.κ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ογκός ψεκ. υγρού 75-110 λίτρα/δέκ. Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών από την πτώση των πετάλων. **ΦΡΑΟΥΛΑ (Θερμοκηπίου):** Κίτρινος Τετράνυχος: 50-100 κ.ε.κ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ογκός ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/δέκ. Με την εμφάνιση της προσβολής. **ΤΟΜΑΤΑ (Υπαίθρου):** Κίτρινος Τετράνυχος, Λιριόμωα: 50-100 κ.ε.κ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ογκός ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/δέκ. Με την εμφάνιση της προσβολής. **ΤΟΜΑΤΑ (Θερμοκηπίου):** Κίτρινος Τετράνυχος, Λιριόμωα, Τυτα absoluta: 50-100 κ.ε.κ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ογκός ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/δέκ. Με την εμφάνιση της προσβολής. **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου):** Κίτρινος Τετράνυχος: 50-100 κ.ε.κ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ογκός ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/δέκ. Με την εμφάνιση της προσβολής. **ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΙΤΟΥΖΙ (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου):** Κίτρινος Τετράνυχος, Λιριόμωα: 100 κ.ε.κ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ογκός ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/δέκ. Με την εμφάνιση της προσβολής.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** Επειδηδούλη, Φράουλα, Πεπόνι, Καρπούζη: 2 / 7 ημέρες. Αχαλαδία: 2 / 15 ημέρες. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** 1) Να χρησιμοποιείται πριν φτάσουν τα ακάρεα στο στάδιο του ακμαίου. 2) Οι μεγάλες δοσεις εφαρμόζονται σαν υπόρους μεγαλύτερη πλήθυνσιν.

**Τελευταία επέμβαση πριν τα συγκρόμιδη (ημέρες):** Επειδηδούλη 10, Αχαλαδία: 28, Φράουλα (Θερμοκηπίου), Τομάτα (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου), Μελιτάνα (Θερμοκηπίου), Λιριόμωα (Θερμοκηπίου), Επειδηδούλη (Υπαίθρου), Καρπούζη (Υπαίθρου); 3 Πεπόνι (Υπαίθρου), Καρπούζη (Υπαίθρου); 5.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος



### ΠΕΡΙΠΟΛΟΜΕΝΟ

100ml

Αρ. Παρτίδας/Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε συσκευασία