



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 216 (Έντυπο 12), ημερομηνίας 25/02/2020 για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την έγκριση όλων των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόν και

την επιστολή του αιτητή για τροποποίηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της οριστικής άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα και

τις αιτήσεις με αρ. 4108 και 4537 (Έντυπο 08), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

την αίτηση με αρ. 827 (Έντυπο 09) για τροποποίηση άδεια φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τον Υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά και το Διανομέα,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ZAPPY DP με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

363

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

09/02/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/04/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

Sulphur Mills Limited

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

A&E Stylianos Technochimiki Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

A&E Stylianos Technochimiki Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

ZAPPY DP

2. Μορφή:

Σκόνη επίπασης (DP)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

sulphur: 96 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 3 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Sulphur Mills Limited

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Sulphur Mills Limited, Ινδία
2. PASO MORMINO & FIGLIO, Ιταλία
3. MANNINO s.p.a., Ιταλία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Sulphur Mills Limited, Ινδία
2. PASO MORMINO & FIGLIO, Ιταλία
3. MANNINO s.p.a., Ιταλία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα ή επένδυση	500 γραμ. 1, 2, 3, 5 και 6 κιλών.	Σακούλα Πολυαιθυλενίου. Κουτί χάρτινο ή κουτί χάρτινο με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου
2	Σάκος	10, 15, 20 & 25, 30 και 50 κιλών.	Χαρτόσακος τετραπλών στρώσεων με εσωτερική στρώση πολυαιθυλενίου

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

sulphur

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

99% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Sulphur Mills Ltd (Sulphur Mills Limited)

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Sulphur Mills Limited

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση για την καταπολέμηση του ωϊδίου στο αμπέλι.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής: Με επίπαση ως έχει

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ελέγχεται	Κιλά / Δεκάριο	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
Αμπέλι (Οινοποίηση και επιτραπέζια σταφύλια)	Ωίδιο (<i>Uncinula/Erysiphe necator</i>)	2,5	α. Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ. β. Κατά την άνθηση γ. Μετά το δέσιμο των ραγών δ. Κάθε 5-10 μέρες μέχρι την ωρίμανση των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-10 ημερών
Παρατηρήσεις: 1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. 2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας 3. Να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. 4. Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων. 5. Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 15°C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασίες μεταξύ 20°C – 30°C.				

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι	5 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: M2

Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μην εισέλθετε για τη συγκομιδή σταφυλιών νωρίτερα από 5 ημέρες μετά την εφαρμογή.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 10 ημέρες από την εφαρμογή παραφινικού λαδιού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα.
Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30°C) παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά.

10. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με άλλο γεωργικό φάρμακο. Εφαρμόζεται μόνο του

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P264 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Φοράτε κατάλληλη μάσκα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια όταν εισέλθουν σε χωράφι αμέσως μετά την εφαρμογή
Sp1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρώματα μη στόχους, να αφήσετε μια ζώνη ασφαλείας **10 μέτρων** από ακαλλιέργητη γη.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P305+P351: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Επιτρέπεται η πλήρης εξάντληση των αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα.
2. Όσα φυτοπροστατευτικά προϊόντα παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 09/02/2024

